CORRECTEUR DE MANGANÈSE ET ZINC



CARACTÉRISTIQUES

Formulation spéciale pour aider à prévenir et corriger les états de carence de manganèse et de zinc simultanée.


KELOM MnZn Flow est une suspension très concentrée (FLOW) de sels de zinc et de sales de manganèse et est libre de chlore. Totalement soluble dans l'eau. Une application combinée de Zn et Mn est plus efficace que l'application séparée des deux éléments.

En raison des caractéristiques physiques de KELOM MnZn Flow snous pouvons optimiser l'absorption des nutriments (Zn et Mn) et un période plus prolongé du produit sur la feuille, ainsi que la période d'efficacité de l'application est étendue.

KELOM MnZn Flow contribue à des usines de récupération rapides touchées par le gel ou d'autres phénomènes météorologiques, et fournit également du soufre et de l'azote de la plante, qui sont les principaux constituants des enzymes végétales et protéines.

COMPOSITION

13,50 %p/v - 8,10 p/p Zinc total (Zn) 13,50 %p/v - 8,10 p/p Manganèse (Mn) Azote total 5,80 %p/v - 3,50 p/p Soufre total 15,00 %p/v - 9,7 %p/p pH (10% solution à) 5.5-6.5 Densité 1,55



DOSAGE ET APPLICATION

CULTURE	L/ha	cc/100L eau	APPLICATION
Fraise, framboise, baies, mûres	1,5	200 cc/hl	Appliquer avant la floraison et le bourgeonnement.
Feuille horticulture	1-2	300 cc/hl	Appliquer à aprtir de 4-6 vraies feuilles SOLUTION FLOW Mn Zn N
Céréales	1-2	300 cc/hl	Appliquer à aprtir de 5 vraies à la floraison
Vegetables, tomate, oignon, etc	1-2	300 cc/hl	Appliquer à aprtir de 4-6 vraies feuilles en avant.
Ornemental	1-2	300 cc/hl	Appliquer au début de la croissance des pousses
Agrumes	3-5	150-200 cc/hl	Au début de la croissance des pousses au printemps, répéter 20 jours. Répétez l'opération pour l'été-automne
Peach, Olive, Cerise, Noisette	3-5	150-200 cc/hl	Appliquer de pointes vertes à des pousses de 5-8 cm. Appliquer une dose plus élevée après la récolte de 30 jours avant la chute des feuilles.
Nuts	3-5	150-200 cc/hl	Au début de bourgeon de la fleur de répéter l'application de 15-18 cm.
Pomme, Poire	3-5	150-200 cc/hl	Appliquer une dose plus élevée après la récolte de 30 jours avant la chute des feuilles. Au cours de la croissance, à partir de la pointe verte. Répéter tous les 10-15 jours. Appliquer dose supérieure après la récolte
Raisins de table, Raisins de vin	3-5	150-200 cc/hl	Appliquer avec pousses de 30-60 cm, répéter l'initiation florale. Appliquer une dose plus élevée après la récolte de 30 jours avant le début de la chute des feuilles

Remplir le réservoir du pulvérisateur avec la moitié de la quantité d'eau nécessaire. Mesurer la quantité requise de KELOM MnZn FLow et l'ajouter au réservoir faisant une agitation constante. AJOUTER LE RESTE D'EAU ET PULVÉRISER.

KELOM MnZn FLow doit être stocké à l'abri du gel, avec une gamme de stockage optimale entre 5-40 ° C. Dans les situations de stockage prolongé peut être un léger tassement des particules de nutriments. C'est réversible si on l'agite

Packing



NON TOXIQUE

