STOP Fruit

REGULATEUR DE LA CROISSANCE

STOP Fruit: C'est un produit entièrement soluble dans l'eau, ce qui affecte les processus impliqués dans abscission. L'abscission se produit par la formation de couches de cellules spécialisées fixation de la liaison entre le fruit et la plante. Auxine (STOP fruit) favorise abscission lorsqu'il est appliqué immédiatement après la nouaison, mais si elle est appliquée plus tard, son effet est de retarder l'abscission du fruit prévenir chute

STOP Fruit est autorisé à pomme pour l'éclaircissage des fruits, et des pommiers et poiriers pour empêcher la chute des fruits.

MANUEL D'INSTRUCCION: Entre la dernière application et la sécurité à long terme de la récolte pas.

TERME DE SÉCUIRITÉ: Si vous êtes nouveau sur STOP fruits ou de produits similaires, consultez avec le service technique de la societé

COMPOSITION
ANA
(1-Naphthaleneacetic acid) SL
8,5 % p/v (85 g/l)

ÉCLAIRCIE ET EVITER LA CHUTE DES FRUITS

DOSES ET APPLICATION

STOP Fruit: s'applique en pulvérisation, trempage et le fruit, les doses indiquées sont seulement indicatif. Le traitement devra être effectué lorsque la température est de 15 à 25 ° C, évitée la présence de rosée et les heures de forte chaleur et NE PAS MÉLANGE AVEC D'AUTRES PRODUITS, si la compatibilité est inconnue.

FRUIT ÉCLAIRCIE

Pomme: 15-20cc/hl S'applique lorsque les vieilles plantes à fruits en bois ayant une taille de 10-15 mm de diamètre, environ 15-21 jours après la pleine floraison.

EVITER LA CHUTE DES FRUITS.

Pomme 40cc/hl **Poiriers:** 15-25cc/hl Appliquer entre 3 et 10 jours avant la récolte, peut-être un traitement répété avec dix à quinze jours. Dans les variétés de récolte tardive peut être exigée des doses plus élevées.

CONDITIONS D'APPLICATION

Une humidité relative élevée (> 70%)
Éviter de traiter avec températures élevées ou trop basses. Les températures douces sont idéales (15-22ºC)
Il est préférable de traiter le soir ou pendant de temps nuageux, car le traitement sèche lentement et permet une bonne et correcte assimilation. L'ANA est détruite par les rayons UV.
Est recommandé l'utilisation de grands volumes d'eau (de 1000 à 1500 l / ha) est recommandé

STOKAGE

Conserver dans le contenant d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, garder hors des enfants. Ne pas laisser les produits geler.

PRESENTATION

NON TOXIQUE

Aspe