NEW
Imported from Spain

LAMIPROTECT

Stimulateur Naturel Des Defenses

LamiProtect SL est une solution très concentrée de Laminaria, extrait de l'espèce d'algues récoltée dans l'Océan Atlantique.
Ce produit est fabriqué dans des conditions propres à préserver la structure polymère naturel des composants organiques.

LamiProtect SL stimule les défenses des cultures. Il renforce leur résistance contre les pathogènes, repoussant ainsi leur seuil de nuisibilité.

Composition:

Matière organique	25,5 % en p/p
Potassium K_2O	4,0 % en p/p
Extrait Laminaria	45 g/l
pH 4.2	

- OÏDIUM DU FRAISIER.
- FEU BACTÉRIEN DU POMMIER ET DU POIRIER.
- TAVELURE DU POMMIER.

- STIMULATEUR NATUREL DES DÉFENSES.
- INOFFENSIF POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT.

DOSAGE ET MODE D'APPLICATION: (FOLIAIRE)

DOSE	PÉRIODE D'APPLICATION	Délai minimal entre le dernier traitment et la récolte.
• OÏDIUM DU FRAISIER		
0,70 L/Ha 0,075 L/Hl	Tous les 10 jours, à partir du départ de la végétation	AUCUN
• FEU BACTÉRIEN DU POMMIER ET POIRIER		
0,70 L/Ha 0,075 L/Hl	1éra application au stade boutons verts (D3). Positionner la dernière application au stade chute des derniers pétales (H). Poursuivre les applications en cas de contaminations ultérieures à la floraison. Nombre maximun d'applications:7	AUCUN
• TAVELURE DU POMMIER		
1 L/Ha 0,1 L/Hl	Tous les 10 jours, du début de la période des contaminations secondaires *LamiProtect SL* s'utilise contre la tavelure du pommier pendant la pèriode des contaminations secondaires. Il s'applique durant les périodes de risques moyens. En période de risques forts de contamination; pluies successives pendant au moins 18 heures ou supérieures à 25mm, appliquer un fongicide spécifique contre la tavelure.	AUCUN

PRESENTATION

NON TOXIQUE

Zero Residues

Aspe