Algex Amyn

Engrais fait à base d'algues avec Acides Aminés
Ascophyllum Nodosum

CHARACTERISTICS

ALGEX Amyn est un produit qui combine de manière équilibrée l'action des L-α acides aminés d'extraits d'origine végétale et d'algues ***Ascophyllum Nodosum,*** obtenant un biostimulant complète.

En raison de la synergie entre les acides aminés d'origine végétale (dérivé de l'hydrolyse enzymatique, un processus que ne change pas sa structure et fonction) et les algues (riches en facteurs de croissance naturels)

ALGEX Amyn:
Favorise l'épargne et de l'activité énergie métabolique. Favorise la synthèse des protéines et des substances naturelles.

- **STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE LA RACINE, LA GERMINATION ET LA FLORAISON.**
- **AMÉLIORATION DE LA CAILLE, LA MADURATION ET LA COULEUR DES FRUITS, ELEVAGE DE LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ.**
- **AIDE A LA PLANTE À DÉPASSER LES SITUATIONS DE STRESS DANS LES MOMENTS PLUS CRITIQUES DU PERIODE DE CROISSANCE.**

COMPOSITION

Extrait d'algues marines	
(Ascophyllum Nodosum)	40 %p/p
Acides amines libres	10 %p/p
Azote	5 %p/p
Densité 1,1	
pH (10%) 6-7	



DOSAGE ET APPLICATION

CULTURES	PÉRIODE D'APPLICATION	DOSAGE FOLIAIRE
Horticole	Une semaine après la transplantation. Applications quatre espacés de 10 jours.	**100-250 cc/hl**
Agrumes, olive, banane, raisin	Pendant la préfloraison, la mise à fruit et le développement des fruits en le période de stress.	**250-300 cc/hl**
Céréales	1-2 utilisé entre élongation de la tige et le début de la montaison	**100-250 cc/hl**
Maïs	1 application dans les plantes de 25-50 cm	**100-150 cc/hl**
Coton	Après avoir d'enlevé le plastique début de la floraison et un mois plus tard	**250-300 cc/hl**
Ornement et serres	Au cours de la croissance et du développement	**250 cc/hl**
Pâturage et l'herbe	Au début de la croissance et après chaque coupe	**100-250 cc/hl**

DOSAGE DE FERTIRRIGATION Pour toutes les cultures, une dose recommandée est de 2,5-5 L / ha et l'application

AVERTISSEMENT :
Éviter les mélanges d'Algex Amyn avec des produits pétroliers ou cuivre minérale.
Les dosages sont uniquement à titre indicatif et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la région et les besoins des cultures.

PACKAGING

NON TOXIQUE

Aspe