CUC 38 SC

Suspension d'Oxychlorure de Cuivre

Composition:
Oxychlorure de Cuivre :
38% p/p / 70% p/v

CUC 38SC est utilisé comme une source de cuivre en culture de grands consommateurs de cet élément pour éviter les états de carence. Il a un effet fongicide remarquable.

Ajuster la dose selon les besoins nutritionnels et de la situation des cultures. Agiter le récipient avant de le dosage; invités à utiliser des machines avec un agitateur. Appliquer lorsque la culture a assez de feuilles pour recevoir un traitement. Ne pas appliquer pendant la floraison. Ne pas appliquer sur les cultures sous plastique ou sous serre. Ne pas mélanger avec polysulfure, thirame ou substances de réaction très acide ou très alcaline.

CULTURES	DOSES : PULVÉRISATION FOLIAIRE
Agrumes	Automne 75 -150 cc/Hl, hiver 200-250 cc/Hl
Horticoles	150-300 cc/Hl
Culture Lignées	150-350 cc/Hl
Fruit Secs	150-175 cc/Hl
Olive	200 -400 cc/Hl, il est conseillé d'appliquer au printemps, été et automne.
Vigne et Poire	Dans la végétation 100-250 cc/Hl et 150-300 cc/Hl en hiver
Céréales	125 cc/Hl et utiliser l'eau de 200L par hectare est recommandé d'appliquer de la deuxième vraie feuille de céréales jusqu'à la deuxième apparition du deuxième noeud; en présence de symptômes de carence la concentration peut être augmentée à 250 cc/Hl en conservant la même quantité d'eau par hectare.

PACKAGING:

Aspe

EC Fertiliser Fertilizante