

NEW
Imported from Spain

CUC 80 RED


ÓXIDO CUPROSO. ACCIÓN FUNGICIDA

CARACTERÍSTICAS

CUC 80 RED es óxido cuproso en forma de suspensión concentrada para aplicar en pulverización foliar. Eficaz en el control preventivo de numerosas enfermedades producidas por hongos endoparásitos y bacteriosis.

COMPOSICIÓN

Cobre (Cu) 80,0% p/v
Densidad 1,7
pH 6,7



PROPIEDADES

- **Alta mojabilidad**
- **Gran cobertura**
- **Incrementa resistencia al lavado por la lluvia**
- **Elevada eficacia baja dosis**
- **Selectividad en su acción**
- **Alta concentración en cobre metal**

DOSIS Y MODO DE EMPLEO


CULTIVOS	USOS AUTORIZADOS	DOSIS
ARROZ	Contra el añublo del tallo y la vaina (Rhizoctonia solani), añublo del arroz (Pyricularia grisea) y la necrosis bacteriana (Xanthomonas spp)	0,20%
CÍTRICOS	Contra las enfermedades bacterianas, Phomopsis y otros hongos Endophyt	0,15%
FRUTALES DE HUESO	Contra el enrollamiento de la hoja, manchas en las hojas del melocotón, la podredumbre parda en árboles frutales y las enfermedades bacterianas.	0,20%
HORTÍCOLAS	Contra alternaria, antracnosis, mildiu y enfermedades bacterianas	0,20%
HORTÍCOLAS DE INVERNADERO	Contra Mildiu	0,20%
MANZANOS Y PISTACHOS	Para prevenir el ataque de la podredumbre parda de árboles frutales y enfermedades bacterianas	0,20%
OLIVO	Contra las manchas en las hojas y la agalla del olivo	0,20%
ORNAMENTALES	Contra el moho y otros hongos Endophyt	0,20%
PATATAS	Contra el tizón tardío de la patata	0,20%
REMOLACHA AZUCARERA	Contra la manchas foliares por Cercospora	0,20%
VIÑAS	Contra mildiu y enfermedades bacterianas	0,20%

OBSERVACIONES

En tratamientos de invierno en manzano y pistacho o árboles frutales de hueso, se recomienda aplicar el producto a una dosis de 0,4% (400 g/hl). Debido a la propia fitotoxicidad del cobre, principalmente en zonas frías y húmedas, la aplicación de **CUC 80 RED** no es aconsejable en cultivos sensibles al cobre, especialmente:

- Durante el período vegetativo de los frutales de pepita o hueso.
- En vides y viñedos, durante la floración.
- En cucurbitáceas: melón, sandía, pepino, etc..

Packing



Aspe