NEW
Imported from Spain

AZOL

FERTILIZANTE NITROGENADO DE LIBERACIÓN CONTROLADA

CARACTERÍSTICAS

AZOL es un fertilizante nitrogenado de alta eficacia y persistencia. El **N-ureico** satisface las necesidades inmediatas y el **N-formaldehido** garantiza una disponibilidad progresiva.
Seguro y respetuoso con el medio ambiente.

VENTAJAS GENERALES

- Liberación progresiva.
- Compatible pesticidas.
- Aplicación foliar.
- Equilibrio vegetativo productivo y sin riesgo de cultivo.
- Mantiene equilibrio vegetativo/productivo en cultivos donde N tiene influencia directa en producción.
- Sin riesgo de lavado, máximo aprovechamiento del nitrógeno. Respeta el medio ambiente.

VENTAJAS CULTIVO

CEREAL
- Incrementa peso especifico
- Aumenta contenido proteico
- Disminuye riesgo de encamado a otros fertilizantes nitrogenados

MAIZ
- En estadios iniciales homogeniza cultivo

ARROZ
- Aumenta peso específico. Mayor llenado de la espiga.

OLIVAR
- Homogeniza maduración fruto.
- Mayor tamaño fruto.
- Incremento neto producción.

COMPOSICIÓN	%p/v
Nitrogeno Total (N)	28%
• N (Urea-formaldehido)	85%
• N (Ureico)	15%
Biuret, Max	menor de 0,7%
pH(Sol al 10%, 20ºC)	9-11
Densidad (20º)	1,23-1,25kg/L

CULTIVOS	DÍAS	ÉPOCA O MODALIDAD	DOSIS
Algodonero	n.p.	En estado de 4 hojas, después de floración y durante la formación de la cápsula	5-8 l/ha - 6-10 kg/ha
Arroz	n.p.	A la emergencia de la hoja bandera	10-15l/ha - 12-19 kg/ha
Cereales	n.p.	1º tratamiento entre pleno ahijado hasta primer nudo. 2º tratamiento entre hoja bandera y floración	10-25 l/ha - 12-31 kg/ha
Césped	n.p.	Aplicaciones cada 50-60 días	15-24 l/ha - 19-30 kg/ha
Cítricos	n.p.	En diciembre, diferenciación floral y después del cuajado	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Cítricos	n.p.	Final del invierno, desde reactivación vegetativa	64-96 l/ha - 80-120 kg/ha fertirrigación
Fresón	n.p.	Inicio de floración y repetir cada 15 días	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Frutales de hueso	n.p.	Antes de floración del fruto y repetir cada 30 días	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Frutales de hueso	n.p.	Final del invierno hasta cuajado	64-96 l/ha - 80-120 kg/ha fertirrigación
Frutales de pepita	n.p.	Antes de floración y repetir cada 30 días	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Frutales de pepita	n.p.	Final del invierno hasta cuajado	64-96 l/ha - 80-120 kg/ha fertirrigación
Hortalizas de hoja	n.p.	A la formación del cogollo y repetir cada 14 días	5-8 l/ha - 6-10
Hortícolas	n.p.	Antes de la floración y aplicaciones cada 10-14 días	5-10 l/ha 6-12 kg/ha
Hortícolas	n.p.	Al inicio del ciclo vegetativo	48-80 l/ha 60-100 kg/ha fertirrigación
Maíz	n.p.	Post-emergencia precoz, junto con herbicidas	10-15 l/ha - 12-19 kg/ha
Maíz	n.p.	Con tratamiento acaricida para araña roja	10-15 l/ha - 12-19 kg/ha
Olivo	n.p.	Desde antes de la floración y repetir cada 30 días	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Olivo	n.p.	Final del invierno, desde reactivación vegetativa	64-120l/ha - 80-150 kg/ha fertirrigación
Soja	n.p.	Estado R2-R3	4-8 l/ha - 5-10 kg/ha
Vid	n.p.	Post-floración	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Vid	n.p.	Final del invierno, desde reactivación vegetativa	48-80 l/ha - 60-100 kg/ha fertirrigación

Packing



Aspe