NEW
Imported from Spain

KELOM plex

HIERRO, MANGANESO, ZINC
CORRECTOR FOLIAR

CARACTERÍSTICAS

Aspe incorpora en KELOM plex la biotecnología de fertilización foliar: *Poliplex*

Así se consigue quelar los micronutrientes **Fe**, **Mn** y **Zn** mediante azúcares - alcoholes (Polioles), que permite:

- **MÁXIMA ABSORCIÓN FOLIAR**
- **TRANSPORTE RÁPIDO Y DIRECTO DE NUTRIENTES VÍA XILEMA Y FLOEMA**
- **INCREMENTA CALIDAD Y RENDIMIENTO**

KELOM plex, distribuye los nutrientes a los puntos de:

- Crecimiento vegetativo (hojas, pelos radiculares, tallos y ramas).
- Crecimiento reproductivos (yemas, flores, frutos y semillas).

La formulación única de KELOM plex que incorpora la tecnología *Poliplex* ha sido especialmente desarrollada para corregir las carencias múltiples de **hierro**, **manganeso** y **zinc** en diferentes cultivos (cítricos, frutales, viña...) en las fases de inicio de la recuperación vegetativa (o primeras fases vegetativas), aparición del fruto e inicio del engorde, para mejorar los parámetros cualitativos y cuantitativos de la cosecha.

COMPOSICIÓN

	%p/p
Hierro (Fe) soluble en agua	2,0
Manganeso (Mn) soluble en agua	2,0
Zinc (Zn) soluble en agua	2,0

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	APLICACIONES	DOSIS
Cítricos	Desde el inicio vegetativohasta pre-floración Desde post-floración hasta el fruto	2-3 L/ha
Frutales de pepita (manzano, peral)	Desde las primeras hojas del brote hasta pre-floración Desde caída de los pétalos hasta el fruto	2-3 L/ha
Frutales de hueso (ciruelo, melocotonero, cerezo, etc.)	Desde caída de los pétalos hasta el fruto	2-3 L/ha
Uva de Vinificación	Desde brotación hasta pre-floración Desde post-cuajado hasta la formación de los granos	2-3 L/ha
Uva de mesa	Pre-floración Post-elongación	2-3 L/ha
Kiwi	Desde brotación hasta pre-floración	2-3 L/ha
Avellano, nuez	Desde brotación hasta floración Post-cuajado	2-3 L/ha
Hortícolas al aire libre: Solanáceas (Tomate, Pimiento, Berenjena, etc.) Cucurbitáceas (melón, sandía, pepino, calabacín, etc.)	Primeras fases vegetativas Crecimiento frutos o partes comestibles	2-3 L/ha
Hortícolas de invernadero	Mismas fases de los hortícolas al aire libre con dosis reducidas	2-3 L/ha
Alcachofa	Inicio crecimiento de primavera Inicio formación de la cabecita	2-3 L/ha
Patata	Planta de 15 cm Pre-floración, después de 15 días	2-3 L/ha
Cultivos extensivos (soja, sorgo, remolacha azucarera, tabaco, girasol, arroz, colza, etc.)	Primeras fases vegetativas e inicio formación partes comestibles	2-3 L/ha
Alfalfa	Primeras fases vegetativas después del corte	2-3 L/ha
Ornamentales	Desde comienzo vegetativo hasta pre-floración	2-3 L/ha

Packing



Aspe