Color K

FERTILIZANTE POTÁSICO

COMPOSICIÓN		
Potasio (K_2O)	38,5 %	p/v
EDTA	2,0 %	p/v
pH	10 - 11	
Densidad	1,4	

Mejora el sabor de los frutos. Aumenta el contenido en azúcares y la consistencia del fruto. Especialmente indicado para el engorde y maduración. **Aplicado en olivo, mejora el contenido graso.** La presencia de EDTA aumenta la eficacia, al mejorar la disponibilidad de potasio en la planta en los momentos de mayor necesidad.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE CULTIVOS

CULTIVOS	ÉPOCA	DOSIS
ALGODÓN	2-4 tratamientos a lo largo del ciclo de vida del cultivo.	HOJA: 130-350 cc / 100 L FERTIRRIGACIÓN: 40-60 L / Ha Cada 15 días.
CÍTRICOS	En el cuajado, en el engorde y antes de la cosecha.	
FRESA - FRESÓN	1-3 tratamientos en la floración, la formación del fruto y de los tubérculos.	
FRUTALES	En el cuajado, en el engorde y antes de la cosecha.	
FRUTOS TROPICALES	2-4 tratamientos a lo largo del ciclo de vida del cultivo.	
HORTÍCOLAS	2-6 aplicaciones a lo largo del ciclo vegetativo del cultivo.	
OLIVO	En el cuajado, en el engorde y antes de la cosecha.	
ORNAMENTALES	2-4 tratamientos a lo largo del ciclo de vida del cultivo.	
REMOLACHA AZUCARERA	Desde 2 meses antes de la recolección.	
VID	Época de engorde, maduración y coloración del fruto.	

PRESENTACIÓN

ABONO CE