Growth MIX

NEW

REGULADOR DE CRECIMIENTO

CARACTERISTICAS

Growth MIX es un regulador de crecimiento vegetal equilibrado, con nutrientes, aminoacidos y ácidos fúlvicos, todos de gran importancia e impacto en los procesos fisiológicos y en el metabolismo de las plantas. Todos los componentes de **GROWTH MIX** se encuentran en forma asimilable por las hojas y otros órganos de la planta.

El balance existente entre las concentraciones de auxinas, giberelinas y citoquininas en **Growth MIX**, permiten tener una aportación significativa de estos compuestos a la planta sin provocar un desequilibrio hormonal.

COMPOSICION

Giberilinas	500 ppm	Calcio Ca)	0,8 %p/p
Auxinas	500 ppm	Zinc (Zn)	2,0 %p/p
Citokininas	200 ppm	Azufre (S)	0,8 %p/p
Cisteina	500 ppm	Ácidos fulvic	25,0 %p/p
Tiamina	1100 ppm	Nitrógeno (N)	9,0 %p/p
Inositol	200 ppm		
Diluyentes y acondicionadores			62,0 %p/p

DOSIS Y APLICACION

Acelga, Espinaca y lechuga de hoja abierta: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha de 3 a 4 semanas después de la nacencia.

Algodón: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha al momento de la aparición de los primeros y segundos cuadros. Aplicar principalmente en variedades de porte medio y bajo o para salir de una etapa de estrés.

Ajo y cebolla: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha en los momentos previos a la diferenciación del bulbo (10-12 semanas después de la siembra).

Alfalfa: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha después de cada corte, cuando aparezca el rebrote. Apio: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha , aplicar de 4 a 6 semanas antes del corte.

Brócoli, Coliflor, Repollo y Lechuga romana: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha al inicio de la formación de la cabeza (inflorescencia)

Cebollino y Puerro: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha a los 30 días después del transplante para puerro y 45 días después de la siembra para cebollino, repetir 30 días después.

Cucurbitáceas (Pepino, Melón y sandía): Aplicar de 0,75 a 1 L/ha cuando las plantas tengan de 3 a 5 hojas verdaderas. Repetir al inicio de la formación de guias, continúe cada 15 días hasta el último corte.

Cereales (trigo, cebada, avena, triticale): Aplicar de 0,75 a 1 L/ha al momento de pleno amacollamiento, inicio de encañe y embuche.

Melón: En plantaciones de 1 o 2 años, aplicar de 0,75 a 1 L/ha durante el ciclo. En cultivos de 3 a más años hacer 2 aplicaciones con intervalo de 30 días entre cada una. La primera cuando la planta tenga 30 cm de altura y la segunda a los 50cm de altura.

Flores: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha al momento de la aparición de los botones o vástagos florales.

Frijol, Ejote, Soja: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha al momento de la aparición de los botones florales y repetir de 1 a 3 veces cada 15 días.

Maíz y sorgo: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha entre las 6 y 8 hojas completamente desarrolladas, y de ser posible repetir en plena floración.

Patata: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha al tiempo de inicio de tuberización y repetir de 15 a 30 días después.

Tomate, pimiento y berenjena: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha a la aparición de las flores, repetir cada 2 o 3 semanas hasta la última floración comercial.

Tabaco: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha a los 30 días después del transplante y repetir 30 días después.

Cítricos, aguacate, mango, papaya y guayaba: Aplicar de 150 a 200ml por cada 100L de agua a la aparición de las floraciones repitiendo 30 días después.

Manzano y melocotón (durazno): Aplicar de 150 a 200ml por cada 100L de agua en puntas plateadas (manzano) y en puntas verdes (melocotón) y repetir cuando el fruto tenga de 1 a 2 cm de diámetro.

Fresa: Aplicar de 0,75 a 1 L/ha una vez por mes, iniciando al momento de la aparición del primer racimo floral.

PRESENTACION

NO TÓXICO

Aspe Factory