STOP Fruit

NUEVO

REGULADOR DE CRECIMIENTO

PRECAUCIONES DE USO

STOP Fruit: Es un producto totalmente soluble en agua, que incide sobre los procesos relacionados en la abcisión del fruto. La abcisión tiene lugar por la formación de diversas capas de células especializadas que aseguran la conexión entre el fruto y la planta. La auxina (STOP Fruit) promueve la abcisión si se aplica inmediatamente después del cuajado del fruto, pero, si se aplica más tarde, su efecto es retrasar la abcisión del fruto evitando la caída de la fruta.
STOP Fruit está autorizado en manzano para el aclareo de fruto, y en manzano y peral para evitar caída del fruto.

INSTRUCCIONES DE USO

Entre la última aplicación y la recolección no hay plazo de seguridad.

TERMINO DE SEGURIDAD: Si no se tiene experiencia con STOP Fruit o productos similares, consúltese con el servicio técnico de la empresa.

COMPOSICION

ANA
(1-Naphthaleneacetic acid)
(SL) 8,5 % (p/v)

ACLAREO Y EVITA LA CAÍDA DE FRUTOS

DOSIS Y APLICACION

STOP Fruit: se aplicará en pulverización, mojando bien los frutos, siendo las dosis indicadas de carácter orientativo. El tratamiento se efectuará cuando la temperatura sea de 15 a 25ºC, y se evitará la presencia de rocío así como las horas de calor fuerte y NO SE MEZCLARÁ CON OTROS PRODUCTOS si no se conoce su compatibilidad.

Aclareo de frutos
Sólo en manzano: 0,02% (20cc/hl) Se aplicará cuando los frutos centrales de madera vieja tengan un tamaño de 10-15 mm de diámetro, aproximadamente 15-21 días después de la plena floración.

Evitar la caída del fruto.
En manzano y peral: 0,04% (40cc/hl) Aplicar entre 3 y 10 días antes de la de la recolección, pudiéndose repetir el tratamiento con un intervalo de diez a quince días.

PRESENTACION



NO TOXICO

Aspe Factory