AF Gibberellic SL

NUEVO

REGULADOR DE CRECIMIENTO

PRECAUCIONES DE USO

Vigilar que el viento no arrastre la pulverización a otros cultivos vecinos. Aplicar el producto poco después de mezclarlo con agua para evitar su descomposición. En caso de producirse una precipitación a las 8 horas siguientes al tratamiento, éste perderá parte de su eficacia, siendo acosejable repetir el tratamiento.

COMPOSICION

Acido Gibberelico (GA3)
1,6% (p/v)
Líquido soluble (SL)

INSTRUCCIONES DE USO:

Tratar a alto volumen de agua (600-1500 l/Ha). Adicionar mojante

CULTIVO/TRATAMIENTO	DOSIS
Clementino: Para mejorar la consistencia de la piel (tratar cuando el color verde haya desaparecido).	**30-50 cc/hl**
Limonero y clementino sin hueso: Para inducir el cuajado y la fijación del fruto. Tratar a la caída del pétalo y repetir el tratamiento a las 3-4 semanas.	**40 cc/hl**
Mandarino: Para evitar la caída de los frutos (tratar a la caída de pétalos, repitiendo a las 3-4 semanas) y mejorar la consistencia de la piel (tratar cuando el color verde haya desaparecido).	**40 cc/hl**
Peral (Cv. Blanquilla): Para reducir la caída del fruto durante el cuajado y evitar daños producidos por heladas. Tratar con el 30-60% de flor abierta o a las 48 horas para evitar el efecto de la helada.	**60-70 cc/hl**
Vid (Cv. Macabeo): Para inducir el alargamiento del racimo y de los pedúnculos del fruto. Aplicar antes de la caída de los capuchones florales.	**30-50 cc/hl**
Fresal: Para favorecer el cuajado y el crecimiento del fruto. Tratar un poco antes del inicio de floración. Se puede reducir la dosis en plantaciones de más de un año.	**60 cc/hl**
Alcachofa: Para inducir el crecimiento y precocidad de la cosecha. Tratar al inicio de la fructificación.	**40-50 cc/hl**

PRESENTACION



NO TOXICO

Aspe Factory