NEW
Imported from Spain

KELOM plex

LE FER, LE MANGANÈSE, LE ZINC, LE CORRECTEUR FOLIAIRE

CHARACTERISTIQUES

Aspe incorpore dans in KELOM plex la biotechnologie de fertilization foliaire: Poliplex

Elle résulte de micronutriments chélates de **Fe, Mn et Zn** par les sucres Alcoliques (poyols), permettant

- **NE ABSORPTION MAXIMUM FOLIAIRE**
- **TRANSPORT DIRECT ET RAPIDE DES NUTRIMENTS CIA XYLEM ET PHLOEM**
- **AUGMENTE LA QUALITE ET LA PERFORMANCE**

KELOM plex, distribue des nutriments pour :

- La croissance végétative (feuilles, racines, tiges et les branches).
- La croissance de la reproduction (bourgeons, fleurs, fruits et graines).

La formulation unique et complexe de KELOM plex qui intègre la technologie, Poliplex a été spécialement développé pour corriger les multiples carences en **fer, le manganèse et le zinc** dans les différentes cultures (agrumes, arbres fruitiers, vigne ...) dans la phase de début de la reprise végétative (ou début des stades végétatifs), l'apparence du fruit et le début de l'engraissement, à améliorer les paramètres quantitatifs et qualitatifs de la récolte.

COMPOSITION

	%w/w
Fer (Fe) soluble dans l'eau	2,0
Manganese (Mn) soluble dans l'eau	2,0
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	2,0

LA DOSE ET LA FAÇON D'UTILISER

RÉCOLTE	APPLICATIONS	DOSE
Agrumes	Depuis le début végétatif de préfloraison Depuis la période post-floraison jusqu'au fruit	2-3 L/ha
Arbres fruitiers à pépins (Pomme, poire)	Dès les premières feuilles de l'épidémie jusqu'à la période de préfloraison Depuis la perte des pétales jusqu'au fruit	2-3 L/ha
Fruits drupe (prune, pêche, cerise etc.)	De la germination jusqu'au stade de préfloraison De jeu post-fruits jusqu'à la formation des grains	2-3 L/ha
Vin de raisin	Préfloraison Post élongationhe grains	2-3 L/ha
Raison de table	De la germination jusqu'au stade de préfloraison	2-3 L/ha
Kiwi	De la germination jusqu'au stade de préfloraison	2-3 L/ha
Amande, noisettes	De la germination jusqu'au stade de préfloraison Post-fruit	2-3 L/ha
Horticulture extérieure: solanacées (tomate, poivron, aubergine, etc.), les cucurbitacées (melon, pastèque, concombre, courgette, etc.)	Premières phases végétatives Culture de fruits ou parties comestibles	2-3 L/ha
Horticulture de serre	Mêmes étapes que l'horticulture d'extérieur avec des doses réduites	2-3 L/ha
Artichaud	Lancer la croissance au printemps Commencement de la formation de la tête	2-3 L/ha
Pomme de terre	Plante de 15 cm Préfloraison avec 15 jours	2-3 L/ha
Grandes cultures (soja, sorgho, betterave à sucre, tabac, tournesol, riz, colza, etc.)	Préfloraison et commencement de la formation des parties comestibles	2-3 L/ha
Luzerne	Premières étapes végétatives après la coupe	2-3 L/ha
Ornemental	Dès que la phase végétative comment jusqu'à la préfloraison.	2-3 L/ha

Emballage



Aspe